

İngilizce

Application and Recommended Dosages

USAGE AREA	APPLICATION TIME	FOLIAR APPLICATION (cc/100 Lt WATER)
Table seedless grapes	<ol style="list-style-type: none">1. It is applied before flowering, when the clusters are 4-8 cm long, to extend the length of the clusters.2. It is applied for grain thinning during the full bloom period, that is, when 70-80% of the flower petals have fallen off.3. After flowering, when the grains reach a scattering size of 3 mm, it is applied for grain coarsening.	2 tablets 2 tablets 2 tablets
Seedless grapes for drying	It is applied 4-5 days after the flower capsules fall to increase yield.	1 tablet
in mandarins	It is applied in the period when 75-80% of the flowers are opened in Satsuma and Clementine varieties in order to reduce flower drop, increase fruit set and increase productivity.	1.5 tablets
in oranges	<ol style="list-style-type: none">1. To prevent June drop in Jaffa oranges, it is applied 4-5 weeks after the completion of flowering.2. Washington Navel çeşidinde meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek amacıyla meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede uygulanır..	2 tablets 1-2 tablets
in lemons	It is applied when the first color change is seen on the fruits, to ensure that the fruits remain on the tree for 2-3 months.	1 tablet
in grapefruits	It is applied when the first color change is seen on the fruits in order to delay the harvest without rotting, deterioration or softening of the fruit peel.	1 tablet
in pears	<ol style="list-style-type: none">1. It is applied in the period when 30% of the flowers are opened in order to increase the yield of pear varieties with low fruit set.2. In addition, it is applied at least 2 days after frost to ensure parthenocarpic fruit formation after frost events that occur during flowering.	1,5-2 tablets 0,5-2 tablets
In Cherries	It is applied during the period when color change begins in order to delay the harvest and obtain large and brightly colored grains.	1-2 tablets
in peaches	Application to be made in the first week of August delays the flowering of the following year by 3-7 days and prevents the peaches from being damaged by late spring frosts.	1,5 tablets

in strawberries	While the mother plant has 1-6 leaves, it is used in nurseries to propagate the young shoots produced by the mother plant. It is also applied 3-4 weeks before flowering in strawberries to ensure yield, increase yield and enlarge the fruits.	5 tablets
in artichokes	In order to advance the harvest by 1-2 months and to obtain a well-shaped and large product, it is applied especially to the belly part of the plants when the plants have 4-5 leaves and the leaf length is 20-30 cm.	2,5-5 tablets
in potatoes	Before planting, seed potatoes are dipped into the solution prepared with TABLET and planted, thus ensuring fast and regular emergence.	2 tablets
In lettuces	It is applied 7-15 days before harvest to encourage umbilical binding.	1-2 tablets
in peppers	To increase yield, it is applied when half of the flowers bear fruit and 2-3 weeks later.	3 tablets
in ornamental plants	In cut flowers, it is used on chrysanthemums, roses, cyclamens and carnations to obtain long stems and large flowers.	4-15 tablets
Wheat	It is applied during the budding period of wheat to increase productivity.	1 tablet/da
Tomatoes (Greenhouse)	To increase efficiency; The first application should be made when 50% of the flowers have set fruit, the second application should be made 20 days after the first application.	3 tablets

Farsça

کاربرد و دوزهای توصیه شده

محصول هدف	زمان درخواست	محلول پاشی (سی سی/100 لیتر آب)
انگور بدون هسته	۱. قبل از گلدهی زمانی که خوشه ها 4-8 سانتی متر طول دارند استفاده می شود تا طول خوشه ها کشیده شود. ۲. برای نازک شدن دانه در دوره شکوفه کامل، یعنی زمانی که 70 تا 80 درصد گلبرگ های گل افتاده اند، استفاده می شود. ۳. پس از گلدهی، زمانی که دانه ها به اندازه پراکنندگی 3 میلی متر رسید، برای درشت شدن دانه استفاده می شود.	۲ قرص
انگور بدون هسته برای خشک کردن	روز پس از ریزش کیپول های گل برای 4-5 افزایش عملکرد استفاده می شود.	۱ قرص
ماندارین ها	در دوره ای که 75-80 درصد گل ها در ارقام ساتسوما و کلمانتین باز می شوند به منظور کاهش ریزش گل، افزایش تشکیل میوه و افزایش بهره وری استفاده می شود.	

در پرتقال	۱. برای جلوگیری از ریزش ناگهانی پرتقال یافا در خرداد، 4 تا 5 هفته پس از اتمام گلدهی استفاده می شود ۲. در دوره ای که تغییر رنگ در وارپته واشنگتن ناول شروع می شود استفاده می شود تا زمان ماندن میوه ها روی درخت و تنظیم برداشت افزایش یابد	۲ قرص ۲-۱ قرص
در لیمو	هنگامی که اولین تغییر رنگ روی میوه ها مشاهده شد استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که میوه ها به مدت 2-3 ماه روی درخت باقی می مانند	۱ قرص
در گریپ فروت	زمانی استفاده می شود که اولین تغییر رنگ روی میوه ها مشاهده شود تا برداشت بدون پوسیدگی، خراب شدن یا نرم شدن پوست میوه به تأخیر بیفتد	۱ قرص
در گلابی	۱. در دوره ای که 30 درصد گل ها باز می شوند به منظور افزایش عملکرد ارقام گلابی با میوه کم استفاده می شود ۲. علاوه بر این، حداقل 2 روز پس از یخبندان استفاده می شود تا از تشکیل میوه پارتوکارپ پس از رویدادهای یخبندان که در طول گلدهی رخ می دهد اطمینان حاصل شود	۲-۱.۵ قرص ۲-۰.۵ قرص
در گیلاس	در دوره ای که تغییر رنگ شروع می شود به منظور تأخیر در برداشت و به دست آوردن دانه های درشت و رنگارنگ استفاده می شود	۲-۱ قرص
در هلو	مصرف در هفته اول مرداد گلدهی سال بعد را 3 تا 7 روز به تأخیر می اندازد و از آسیب دیدن هلو در سرماي دیررس بهاره جلوگیری می کند	۱.۵ قرص
در توت فرنگی	در حالی که گیاه مادری دارای 1 تا 6 برگ است، در نهالستان ها برای تکثیر شاخه های جوان تولید شده توسط گیاه مادر استفاده می شود. همچنین 3-4 هفته قبل از گلدهی در توت فرنگی برای اطمینان از عملکرد، افزایش عملکرد و بزرگ شدن میوه ها استفاده می شود	۵ قرص
در کنگر فرنگی	برای پیشبرد برداشت 1-2 ماهه و به دست آوردن 1 محصولی خوش فرم و درشت، مخصوصاً در قسمت شکم بوته ها زمانی که بوته ها 4-5 برگ دارند و طول برگ ها 20-30 سانتی متر است استفاده می شود .	۲.۵-۵ قرص
در سیب زمینی	قبل از کاشت، بذر سیب زمینی را در محلول تهیه شده با قرص فرو برده و کاشت می کنند تا از سبز شدن سریع و منظم اطمینان حاصل شود	۲ قرص
در کاهو	تا 15 روز قبل از برداشت برای تشویق بستن 7 ناف استفاده می شود	۲-۱ قرص
در فلفل	برای افزایش عملکرد، زمانی که نیمی از گل ها میوه می دهند و 2-3 هفته بعد استفاده می شود	۳ قرص
در گیاهان زینتی	در گل های شاخه بریده روی گل های داوودی، رز، سیکلامن و میخک برای به دست آوردن ساقه های بلند و گل های بزرگ استفاده می شود	۴-۱۵ قرص
گندم	در طول دوره جوانه زدن گندم برای افزایش بهره وری استفاده می شود	۱ قرص
گوجه فرنگیها (گلخانه)	برای افزایش کارایی؛ استفاده اول باید زمانی انجام شود که 50 درصد گلها میوه می گیرند، دومین کاربرد باید 20 روز پس از استفاده اول انجام شود	۳ قرص